


a61982



WHO/Ma.1/307 Add.1
8 mars 1962

ORIGINAL : ANGLAIS

RESISTANCE DES VECTEURS DU PALUDISME EN GRECE

SITUATION EN 1960

par le

Professeur Georges D. Belios
Directeur du Département de Paludologie et de Médecine tropicale
Ecole d'hygiène d'Athènes
Consultant auprès du Ministère de la Prévoyance sociale

Afin d'identifier les régions de Grèce dans lesquelles les essais de résistance aux insecticides chez les anophèles adultes ont eu lieu de juin à octobre 1960, il convient de remplacer la première colonne du Tableau II (page 15) par le tableau ci-joint. On pourra de la sorte rapprocher les zones énumérées dans le Tableau II et celles qui figurent au Tableau III, lequel donne la chronologie des pulvérisations rémanentes en Grèce de 1946 à 1960.

	Zone
1	Aloros
2	Anthili
3	"
4	Asterion
5	Chalastra
6	"
7	Drakospilia
8	Dystos
9	Hagh. Athanassios
10	Kalamaki
11	Katohi
12	Koutson
13	Leimonas
14	Nisseloudi
15	Skala
16	"
17	Souli
18	Nissi
19	Photini
20	Poros
21	Agra
22	Karavas
23	Paliouri-Kastri
24	Skiada