



## Առաջին կամ երկրորդ կարգին դասվող պայմանները բոլոր մեթոդների համար (մեթոդը կարող է կիրառվել)

Տարիքը 18-39	ՄԻԱՎ-ի բարձր ռիսկ	Շիստոսոմոզ (բիլիարցիոզ)
Սակավարյունություն, ներայալ մանգաղածև բջջային սակավարյունությունը և բալասեմիան	Անամենեզում գեստացիոն դիաբետի առկայություն	Վիրահատություն առանց երկարատև անշարժացման
Չվարանների բարորակ ուռուցք, ներայալ կիստաները	Անամենեզում արյան բարձր ճնշում հղիության ընթացքում	Հակաբիոտիկների (բացի ռիֆամպինից) կամ գրիզեոֆուլվինի ընդունում
Կրծքագեղձի հիվանդություններ, ընտանեկան անամենեզ, կրծքագեղձի բարորակ հիվանդություն և չախտորոշված նորագոյացություն	Անամենեզում կրնքի օրգանների վիրահատություն ներայալ կեսարյան հատումը	Վահանածև գեղձի հիվանդություններ
Դեպրեսիա	Անկանոն, առատ և երկարատև դաշտանային արյունահոսություն	Տուբերկուլոզ (եթև կոնքային է, ապա ՆԱՊ չի կարելի կիրառել)
Դիսմենորեա	Մալարիա	Սրտի փականների չբարդացած հիվանդություն
Էնդոմետրիոզ	Արտարգանդային հղիություն անցյալում	Երակների վարիկոզ (այնպես)
Էպիլեպսիա	Հետաբորտային շրջան (առանց սեպսիսի)	Վիրուսային հեպատիտ (ոչ ալկոհի)




## Ծանոթագրություններ պայմանների մասին

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> ՆԱՊ կարելի է տեղադրել ծննդաբերությունից հետո 48 ժամվա ընթացքում կամ 4 շաբաթ հետո                             | <b>K</b> Նույնը վերաբերում է նաև վերահսկվող հիպերտենզիային   |
| <b>B</b> Եթե չի ունեցել հաջորդող հղիություն, ՆԱՊ= 2   | <b>L</b> Ռիսկի գործոններն են՝ մեծ տարիքը, ծխելը, շաքարախտը, բարձր ճնշումը  |
| <b>C</b> Կամ թարախային ցերվիցիտի այլ տեսակներ   | <b>M</b> Աուրայի առկայությունը պարզելու համար հարցրեք. «Ծանր գլխացավից առաջ Ձեր աչքին երևում են արոյոք լուսավոր բծեր»: |
| <b>D</b> Եթե այդ վիճակն առաջացել է ՆԱՊ գործածման ընթացքում, ապա կարելի է շարունակել դրա կիրառումը բուժման ընթացքում   | <b>N</b> Առանց աուրայի միգրեն և տարիքը < 35, <O< և <L< = 2<br>Առանց աուրայի միգրեն և տարիքը ≥ 35, <O< և <L< = 3        |
| <b>E</b> Եթե բարձր է սեռավարակների կամ ՄԻԱՎ-ի ռիսկը, խորհուրդ տվեք պահպանակ օգտագործել                                | <b>O</b> Բարդացած շաքարախտ կամ շաքարախտի 20 տարուց ավելի պատմություն, <O<, <L<, ՊՆՀ = 3-4                              |
| <b>F</b> Եթե բարձր է գոնոռեայի կամ խլամիդիոզի առաջացման հավանականությունը, ապա = 3                                    | <b>P</b> <O< = 3, <L< = 2  |
| <b>G</b> Եթե ստանում է հակաեստրոգենային թերապիա = 2   | <b>Q</b> Ֆենիտոին, կարբամազեպին, բարբիտուրատներ, պրիմիդոն, տոպիրամատ, օքսկարբազեպին                                    |
| <b>H</b> ՉԻԱՀ՝ առանց հակաեստրոգենային թերապիայից նկատվող կլինիկական բարելավման = 3                                    | <b>R</b> Եթե կլինիկական վիճակը բարվոք չէ, ապա ՆԱՊ = 3  |
| <b>I</b> <O< և շատ (15 և ավելի գլանակ) ծխող կանայք = 4, <L< և թեթև ծխող կանայք = 2                                    | <b>S</b> Եթե արգանդի խոռոչը դեֆորմացված է, չի կարող կիրառել ՆԱՊ  |
| <b>J</b> Եթե հնարավոր չէ չափել ԶՃ և կինն անցյալում չի ունեցել արյան բարձր ճնշում, բոլոր մեթոդներն էլ կարելի է կիրառել | <b>T</b> 45 տարեկանից մեծ = 2  |

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը հայերեն թարգմանության իրավունք է շնորհել ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագրին, որը լիովին պատասխանատու է հայերեն խմբագրության համար:

Անիվում արտահայտված տեսակետները կարող են չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ տեսակետները:

Երևան 2009 թ.



**1** Մեթոդը կիրառելի է ցանկացած դեպքում

Հիմնականում խորհուրդ չի տրվում կիրառել, բացառությամբ դեպքերի, երբ ավելի հարմար մեթոդի կիրառումը հասու կամ ընդունելի չէ

**3**

**2** Մեթոդը հիմնականում կիրառելի է

Մեթոդը կիրառելի չէ

**4**

**ԱՅԿ հակաբեղմնավորիչների օգտագործման բժշկական չափանիշների անիվ**

Այս անիվն ընդգրկում է հակաբեղմնավորիչ մեթոդների օգտագործման բժշկական չափանիշները՝ ընտրված մեթոդի կիրառումը սկսելու համար:

Չրատարակված է 2007թ.-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից  
**WHO medical eligibility criteria wheel for contraceptive use** վերնագրով:  
 © Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, 2007թ.

